



联合国“生殖权和生殖健康”调查报告指出,全球每年终止妊娠的案例高达4900万宗,因此而死亡的女性超过7万人。在每10个接受危险终止妊娠的女人中,就有1人~5人患有各类并发症,如盆腔感染、大出血、不孕不育和心理创伤等……

微管可视取胚术, 避免“二次伤害”

受访名医:张静 洛阳武警医院妇科主任医师 毕业于河南医科大学,从事妇产科临床工作20余年,先后在西安市第四人民医院、河科大一附院妇产科进修学习,具有扎实的专业理论知识和丰富的实践经验。对妇科常见病、多发病的诊治,方法独特,深受患者好评。

不当取胚后患多, 可致不孕

女性朋友一旦不慎意外怀孕,应当正确对待。

不规范、不专业的终止妊娠手术会带来很多不良后果,特别是对于年轻女性。据相关报道,少女怀孕已经成为一个全球性的问题,全世界每年约有1400万青春少女生育,其中,每天有13万多人次终止意外妊娠。

张静主任介绍,终止妊娠手术非常关键,若实施不当,从短期来看,可能造成术后综合征、子宫穿孔、长期出血、感染以及羊水栓塞;从长期来看,可能导致宫腔粘连、子宫内膜异位症、月经失调甚至不孕症。

流走“意外”,留住“产”权

张静主任介绍,为了减轻患者的痛苦,该院采用的可视取胚术,受术者处于睡眠状态,全身放松。不仅减轻了患者的痛苦,更使医生在不干扰下实施手术,保证手术质量。

该院采用微管可视取胚术,在可视技术引导监测下,采用软而细的微管完成手术,大大克服了传统手术对子宫内膜的损伤,更安全有保障。

健康提示:

取胚后的注意事项

一般来讲,手术时机的选择,以怀孕后40天~50天为宜。此时胎体尚未形成,子宫不太大,子宫壁的肌肉也较厚,胚胎容易吸出来,手术时

间短,出血量少,术后身体恢复得也较快。

取胚手术后,女性朋友应加强保健,如:术后需要一段时间康复治疗,加强营养,以帮助身体尽快恢复;保持外阴清洁,勤换卫生巾;禁止性生活一个月,以避免宫腔感染及再次意外怀孕。需要注意的是,如果流血时间过长,应到医院就诊。

妇科疾病的注意事项

张静主任告诫女性朋友,常见妇科疾病如宫颈糜烂、阴道炎、盆腔炎等都与白带异常有关,一般成年女性应养成每年1次~2次妇科检查的习惯,及时了解自身健康状况。

该院引进的数码电子阴道镜、数字彩超等先进诊断设备,可放大4倍~50倍,清楚观察阴道、子宫颈

等表面病变,快速、准确、高效诊断妇科疾病,在治疗方面引进国际尖端的宫、腹腔镜、海极刀等领先技术,以微创为特色,具有手术创伤小,出血少,疼痛轻,术后恢复快,并发症少等优点,成为现代女性告别病痛,重获健康的“首选”治疗手段。

温馨提示:

目前,该院正积极推广妇科优惠活动,活动期间来院就诊,均可享受免名医挂号费、免白带常规检测费、免早早孕检测费,数字彩超、数字阴道镜、宫颈防癌TCT检测优惠50%。

名医预约:0379-65225959, 65221999;QQ在线:971408950;地址:洛阳市九都路17号

健康常识

白带异常 预示哪些妇科疾病?

白带异常是女性临床常见疾病之一,是女性内生殖器疾病的象征,因此,需引起高度重视——

不同白带异常可能预示着不同的疾病,以下是几种不同白带异常可能警示的不同疾病:

1. 黄色或黄绿色伴有脓样、臭味的白带:多见于化脓性细菌引起的阴道炎、宫颈炎及子宫内膜炎,阴道内异物可以出现这种白带;
2. 带有血液的白带染成红色、棕色或黑色:应考虑宫颈癌、子宫内膜癌、宫颈息肉或黏膜下肌瘤等;
3. 乳白色泡沫状白带伴有外阴部瘙痒者:多为阴道滴虫感染所致;
4. 豆腐渣样或凝乳状白带伴有外阴部奇痒者:多见于阴道霉菌感染;
5. 白带过多常弄湿内裤:可能是子宫黏膜下肌瘤或输卵管癌引起。

妇科名医温馨提示:

女性朋友如出现白带异常情况,应及时查明原因,以便及时治疗。早检查、早诊断、早治疗才能防止妇科疾病发展、恶化。

洛阳网
WWW.LYD.COM.CN
 ——洛阳人的网上家园
 点击生活 服务无限

地址: 洛阳新区开元大道报业大厦22层 广告热线: 0379-65233618