

## 今日关注

# 丙肝能治愈 关键要及时


□ 记者 崔宏远 通讯员 路书斋

近日，“全新‘肝’线告别丙肝——全国丙型肝炎健康咨询流动站宣传活动”项目总结会在北京举行。据了解，这项活动历时4个半月，覆盖了包括我市中心医院在内的全国31个城市62家重点医院。

“同乙肝相比，丙型肝炎只要早发现、早治疗，治愈率可达到60%以上。”市中心医院传染病主任医师张国强说，由于人们对丙型肝炎认识不够，致使全国每年法定传染病疫情报告系统统计的丙肝患者人数呈上升趋势，令丙肝比乙肝更难防控。据中国肝炎防治基金会的一项调查显示：公众对丙肝的知晓率只有38%，远远低于甲肝(91%)和乙肝(95%)。受访人群中，丙型肝炎高危人群的比例占83%，但只有5%的人做过丙肝检测。由于早期症状不明显，我国丙肝漏报率高达52%，成为临床漏报率最高的法定传染病。

## 通过血液传染

“丙型肝炎起病隐匿，通常发展成肝硬化或肝癌时才易被发现。”张国强介绍，血液感染是丙型肝炎传播的主要途径，很多丙肝病人是由共用注射器感染的。尤其是1993年之前，有过献血经历或接受过大量输血者，容易感染丙肝，因为之前我国对献血源的检测没有丙肝



**洛阳脑病医院脑瘫科协办 电话:63970111**

这一项。

张国强指出，除了共用或反复使用注射器易感染丙型肝炎外，与丙型肝炎患者共用剃须刀、牙刷以及不洁性行为，或进行文身、文眉等有创美容也可感染丙型肝炎。

## 早发现易治愈

乙肝可以通过注射疫苗加以预防，丙肝该怎么预防呢？

张国强指出，目前还没有有效预防丙型肝炎的疫苗，预防的途径主要是避免血液接触，对于一些公用器具可用酒精浸泡或高温蒸煮杀灭病毒；拔牙或做有创美容等时，一定要到器械消毒彻底的正规医院，以防传染。高危人群要做到早检测、早诊断、早治疗。通过验血可以判断人体是否感染丙肝病毒。另外，丙肝患者应避免进食高脂高糖类食物和剧烈运动，禁烟禁酒。

# 小心“跟屁虫”盯上你

□ 记者 崔宏远 通讯员 范海岚

近日，网络上一则新闻《“跟屁虫”钻进宝宝屁股蛋儿》迅速引起关注。文章介绍，在辽宁，一个16个月大的宝宝周末跟着父母回了趟乡下老家，屁股上就出现了几条不规则并凸起的红线，经医生诊断，宝宝得的是匐行疹，是“跟屁虫”惹的祸。

真有“跟屁虫”吗？河科大二附院皮肤科主任李永锐介绍，“跟屁虫”其实就是寄生虫的幼虫，宝宝穿开裆裤坐在地上、成人光脚走在地上、进食生鱼片、接触猫狗粪便等都可能被“跟屁虫”盯上。

李永锐介绍，匐行疹又称幼虫移行疹，多由一些寄生虫的幼虫侵入人体并在皮肤内蜿蜒爬行造成皮损，如钩虫、绦虫等。容易受损的部位有脚、臀部、后背等，该病特点为匐行性、细线状、隆起的隧道样红斑皮损，宽2~

3mm，可有一条或多条皮损，主要根据进入的幼虫而定，一般每天匐行数毫米至数厘米。该病伴剧烈的瘙痒，患处很容易因搔抓引发感染。

过去，匐行疹多发生于卫生环境差的地方，且多见于儿童。李永锐表示，现在，随着人们饮食习惯改变和家庭饲养宠物的增多，成人也会被“跟屁虫”盯上。家中的猫狗如果把粪便拉在地板上，人体接触后，就容易感染匐行疹。

临幊上该病的误诊率较高，其症状表现和带状疱疹、游走性红斑等相似，容易混淆。李永锐介绍，判断匐行疹，要到医院做皮肤组织病理切片检查。治疗上，可采取口服驱虫药、液氮冷冻、手术切除等方法，全身损害或继发感染者要

进一步对症处理。预防匐行疹，要注意环境和个人卫生，在户外不要光脚，不要让婴幼儿光屁股坐在地上，也不要接触未经处理的水。居家要经常打扫卫生死角，如果养有宠物，要经常给宠物洗澡并杀虫。

李永锐提醒家长，匐行疹主要感染人体裸露在外的皮肤，所以尽量不要给孩子穿开裆裤，以防孩子出现尿路感染。

## 今日门诊

**洛阳脑病医院**

特约

电话:15838833838

## 身边提示

# 药品说明书哪些信息必看

很多人用药从来不看说明书，但看说明书对安全用药很重要。其实，并不是说明书中所有的信息都有用，我们只需抓住重点即可。

【成分】如果同时在吃多种药物，成分还是看看为好。核对一下几种药品之间主要成分有没有一样的，如果有就不要一起吃了，因为同一种成分重复吃可能过量，安全性失去保证。

【适应症】如果是自主选药，核对适应症是非常重要的。要仔细核对自己的症状和说明书描述的是不是一样，如果不能确定，最好求助专业人士。

【用法用量】注意药的单位，可能是多少片，也可能多少毫克或毫升，有时候需要自己换算。

【不良反应】这一项里包括吃药后可能出现的各种不良状况。了解了这些，



一方面可以预先做好心理准备，另一方面也可以及时发现异常情况，及早处理。有的说明书上会把各种不良反应的发生概率数据写得特别详细，这时只看总述就可以了。

【禁忌】一定要仔细核对，如果符合“禁用”的情况，无论如何也不要吃这个药；如果符合“慎用”的情况，则谨遵医嘱。

【孕妇及哺乳妇女用药】【儿童用药】  
【老年用药】如果是这些人群用药的话，这一项值得关注。不过真正明确指出“能用”或“不能用”的情况很少，很多时候都只是“尚不清楚”，这个时候就只能依靠医生的临床经验了。

【贮藏】对一些不常用的药或特殊疾病用药，注意一下保存环境的特殊要求。  
(越明)

## 温馨提醒

# 秋季降火 别过火

立秋过后天气依然多变，高温、潮湿、闷热各种天气纷至沓来，被老百姓称为“秋老虎”，很多市民被“上火”折磨而寻求各种降火方法。专家提醒，降火过了火，可能出现凉茶过敏症状。

专家指出，从中医的角度看，上火可分为实火和虚火两种。一般来说，症状重、来势猛的属实火，症状轻、时间长又反复发作的是虚火。引起上火的原因很多，除了气候因素外，情绪波动、劳累过度、饮食不当、消化不良等，都会导致体内产生各种“热”的症状，如咽喉干痛、两眼红赤、鼻腔热烘、口干舌燥、烂嘴角、流鼻血、牙痛等症状。

很多人认为这个季节“火”大后，多喝点菊花、胖大海、金银花等泡的凉茶，可以解渴驱火，所以有人一天到晚都在喝野菊花、胖大海、金银花等泡的降火茶。然而，其中有些人出现了食欲下降、口舌生疮、失眠、腹泻等情况。



专家指出，这其实就是凉茶过敏症状，是典型的降火降过了头。专家提醒，部分体质虚弱的人上火后，应以饮食调理为主，饮食要以温为宜，如这个季节要以清补、助阳、滋阴为目的，以降心火、养肺气，要特别注意少吃热性食物，如羊肉、狗肉等。

专家提醒，这个季节要降火，一是多喝白开水、淡盐开水；二是喝温度适宜的茶水补钾；三是喝绿豆汤清热；四是适量吃苦瓜；五是适量食用陈醋，在烹调时加些醋可使胃酸增多变浓，从而增加食欲，还会减少蔬菜中维生素C的损失，有利于食物中铁的吸收。

专家还提醒，不是人人都需要降火，如婴幼儿绝对不能盲目降火，否则会出现腹泻、腹痛、咽痛、咳嗽等症状，还会诱发扁桃体炎、咽炎；月经期的女性和一些患有妇科疾病的女性，体质一般都偏寒，过度饮用降火饮料容易引起痛经、虚脱等现象；另外，体质虚寒的慢性病患者脾胃功能差，常喜温畏寒，也应该避免降火。(壹仁)