

今日天气

4℃~10℃
阴天到多云
偏北风2级~3级

未来几天

日期	天气	气温
11月26日	多云转阴天	3℃~12℃
27日	小雨转多云	3℃~11℃
28日	阴天转小雨	3℃~11℃
29日	中雨转小雨	4℃~10℃
30日	多云	1℃~11℃
12月		
1日	多云	-2℃~12℃

(以上信息来源于网络,仅供参考)

空气质量

11月23日
污染指数 208
空气质量状况 重度污染
首要污染物 PM2.5
(洛阳市环境监测站11月24日发布)

11月24日
PM2.5(μg/m³) 110(18时)

【微言天气】

@一直是晴天的双宝妈:昨天(23日)带着小宝们去了动物园,虽然天阴着,但是在户外活动的宝宝们和妈妈都很开心。我们看了很多动物,小宝宝勇敢地喂了大象,小乐宝怎么也不想去,没有勉强宝贝,我们不能用自己的标准要求孩子。最后宝贝们玩了最喜欢的摩天轮。

@洛阳理工学院雪莲文学社:这几天,洛阳天气不好,校园里,只看到红红的落叶铺了一地!

@会芳同学:这种雾蒙蒙的恶劣天气,出门戴个口罩是很正确的选择,不过一身黑衣服配个蓝口罩总感觉怪怪的。

【诗读四季】

早寒有怀

孟浩然(唐)

木落雁南度,北风江上寒。
我家襄水曲,遥隔楚云端。
乡泪客中尽,孤帆天际看。
迷津欲有问,平海夕漫漫。

【译文】树叶飘落,大雁飞向南方,北风萧瑟因而江上分外寒冷。我的家乡就在弯弯曲曲的襄水边,远隔楚云之端。思乡的眼泪已流尽,客旅的生活无比辛酸,看归来的帆在天边徜徉。风烟弥漫,去渡口的道路迷失了,本想去问路,但只见茫茫江水在夕阳下荡漾。

阴冷天里 等你为我织一条“爱心牌”围巾

□记者 杨凤轩 通讯员 禹东晖

雨后天更寒,冬季街头,有人抱怨天寒,有人顺势牵手。对于我市越冬的小麦来说,这场雨让它们喝饱了水。

本周多阴雨,目前大部地区土壤墒情适宜

昨日,市气象部门发布农业气象周报称,根据2014年11月23日15时我市土壤水分监测站0~50厘米土壤相对湿度资料分析,目前全市大部分地区土壤墒情适宜,汝阳监测站相对湿度大于90%,墒情偏湿。

与前期监测结果相比,22日前后出现的一次降水过程,使栾川、嵩县的轻旱得以解除,而汝阳偏湿面积又有所增加,但就我市总体的农业气象条件而言,大部地区土壤墒情适宜,总体气象条件有利于冬小麦生长。

据市气象台预计,本周我市降水量正常,平均气温略偏低,极端最低气温1℃,山区0℃。本周多西南气流和冷空气活动,阴天降雨天数

较多。

具体预报为,今天全区阴天到多云,偏北风2级到3级,气温4℃到10℃。26日全区多云转阴天,气温3℃到12℃。

市气象台农业气象专家称,近期各地冬小麦要根据苗情和墒情进行分类管理,对群体小、麦苗瘦弱的麦田,可在冬前分蘖盛期追肥一次,并在施肥后及时浇水;麦苗生长偏旺的麦田要进行镇压,控制旺长。雨后墒情偏湿地区,应及时中耕晾晒,增强土壤的透气性,以利小麦根系扎深。

此外,本周冷空气持续影响,气温将明显降低,应加强设施农业的保温、防冻等管理工作。

冷,也是拥抱的理由

前天夜里小雨再来,直到昨日清晨,有些地方小雨还在淅淅沥沥地下着,对于我市大部分地区来说,小雨虽然停了,但太阳好像不太情愿露脸,阴沉沉的天空,让人有一种昏昏欲睡的感觉。

在这样的天气里,有人抱怨天气阴冷,也有人牵手漫步街头。同样的天气,不同的是人们的心情。网友“紫罗幽茗”说:“天冷,其实是老天爷送我们的一个拥抱的理由。”

天气渐冷,毛衣毛裤早已上市,如

今商场里毛衣样式新奇,风格各异,但在不少人的记忆中,最暖和的毛衣还是妈妈亲手织的“温暖牌”,随着妈妈们逐渐老去,会织毛衣的人也渐渐少了。

虽然少有人再织毛衣,但如今每到冬季,还是有不少女孩子会在天气初冷时,给心爱的人编织一条式样简单大方的“爱心牌”围巾。收到围巾的男孩子,也会在寒风里将女孩的手握在手心。

她送他围巾,他为他暖手,这也是冬季才有的温柔。



相关链接

我国部分地区 将再现重度霾


□据 新华社

中央气象台预计,25日8时至26日8时,华北中南部、黄淮北部的静稳条件建立发展,不利于污染物的稀释、扩散,空气污染气象条件转差,上述部分空气污染气象为3级至4级,北京南部、天津西部、河北西部等地有5级,上述部分地区有轻度到中度霾,局地重度霾。

26日8时至27日8时,华北中南部、黄淮北部等地的静稳条件维持,空气污染气象条件为3级至4级,河北西南部的部分地区可达5级,上述部分地区将有轻至中度霾,局地重度霾。



【看图说“花”】



刺儿菜 >>> 田间杂草,优质野菜

□记者 杨凤轩

- 拍摄人:郑笑朋
- 拍摄时间:10月初
- 拍摄地点:伊川县

刺儿菜是小蓟的别称,是一种优质野菜,为多年生草本,地下部分常大于地上部分,有长根茎,其叶缘有细密的针刺,针刺紧贴叶缘,故名“刺儿菜”。

刺儿菜为中生植物,适应能力很强,任何气候条件下均能生长,普遍群生于撂荒地、耕地、路边,为常见的杂草,数量多时,会危害小麦、棉花、大豆等旱作物。除西藏、云南、广东、

广西外,刺儿菜几乎遍布全国各地。欧洲东部、中部和亚洲的蒙古、朝鲜、日本也有分布。

刺儿菜幼嫩时期羊、猪喜食,牛、马较少食。植株秋后仍保持绿色,仍可用以喂猪。另外,刺儿菜还是秋季蜜源植物,带花全草或根茎均为药材。刺儿菜的嫩苗又是野菜,炒食、做汤均可。秋季采根,除去茎叶,洗净鲜用或晒干切段用;春、夏采幼嫩的全株,洗净鲜用;秋季新萌生的越冬型刺儿菜,也鲜嫩可口。

营养专家介绍,刺儿菜每百克嫩茎叶含蛋白质4.8克、脂肪1.1克、碳水化合物5克、钙216毫克、磷93毫克、铁10.2毫克、胡萝卜素7.35毫克。