

聚焦2017年中国反腐“成绩单”，近20名中管干部被立案审查 “百名红通”人员过半归案

□据新华社北京12月13日电

据公开通报，近20名中管干部被立案审查，审判超过30名省部级干部，“百名红通”人员过半归案……2017年，是全面从严治党与惩治腐败的关键一年，一串串数据背后一系列历史性变革正在发生。



(新华社发)

看点一 处分省部级及以上干部56人

党的十九大报告提出，当前，反腐败斗争形势依然严峻复杂，巩固压倒性态势、夺取压倒性胜利的决心必须坚如磐石。

今年前9个月，全国纪检监察

机关立案38.3万件，处分33.8万人，其中省部级及以上干部56人，厅局级干部2300余人，县处级干部1.4万人，乡科级干部5.1万人，一般干部6.3万人，农村、企业等其他人员

20.8万人。党的十九大后，鲁炜、刘强、张阳等高官落马，显示全面从严治党不会松口气、歇歇脚。今年以来，孙政才、王三运、项俊波等近20名中管干部被中央纪委立案审查。

看点二 查处违反中央八项规定精神问题37824起

近日，中央纪委监察部网站制作推出一则《你不必，你可以》的短视频，引发公众对八项规定带来的党风政风巨变的热议。

新时代改进作风持之以恒。这是10月底十九届中共中央政治局会议审议《中共中央政治局贯彻落

实中央八项规定的实施细则》时释放的明确信号。

2017年前10个月，全国查处违反中央八项规定精神问题37824起，处理53195人，给予党纪处分37289人。

根据修订后的实施细则，将

集中针对这几年中央八项规定实施过程中遇到的新情况新问题，着重对改进调查研究、精简会议活动、精简文件简报、规范出访活动、改进新闻报道、厉行勤俭节约等方面进行进一步规范、细化和完善。

看点三 “百名红通”人员过半归案

12月7日，随着原云南省昆明市盘龙区国税局工作人员李文革归案，“百名红通”人员过半归案。这是今年第14名归案的“百名红通”人员，也是党的十九大后的第3名。截至2017年10月，我国已从90多个国家与地区追回

外逃人员3587人，追回赃款95.41亿元人民币。

目前，追逃“布网”随着反腐败国际合作深入扩展。通过设置防逃程序，定期开展“裸官”清理，核查个人有关事项报告情况，严格执行出入境证件管理和审批报备制度，开展

打击利用地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动等，实现新增外逃人员数量大幅下降。

十八届中央纪委工作报告指出，新增外逃人员从2014年的101人降至2015年的31人、2016年的19人，2017年1月至9月为4人。

看点四 十八届中央巡视圆满收官

新修订的党章明确了一届任期内实现巡视全覆盖的要求，并将中央和国家机关部门巡视、市县巡察写入党章，为依法依规开展巡视、推动巡视工作向纵深发展提供了制度

保障。

今年8月，随着第12轮巡视整改情况全部公布，十八届中央巡视圆满收官。12轮中央巡视对277个地方、单位党组织进行“政治体检”，

一届任期内中央巡视全覆盖在党的历史上首次实现。在中央巡视的带动下，各省区市党委也完成8362个地方、部门、企事业单位党组织全面巡视任务。

看点五 在3省市试点基础上推向全国

党的十九大报告提出，深化国家监察体制改革，将试点工作在全国推开；制定国家监察法，依法赋予监察委员会职责权限和调查手段，用留置取代“两规”措施。

11月7日，备受关注的监察法草案首次公布，并向社会征求意见。

草案规定了国家监察工作的一系列重大问题，包括明确中华人民共和国监察委员会是最高国家监察机关，由全国人大产生并对其负责，将对6大类公职人员进行监察，并明确监察委可采取留置等12项措施。

在北京、山西、浙江3省市前期

试点基础之上，全国各地正推开国家监察体制改革。随着今年年底明年年初的地方人大换届，各地的省市县三级监察委将陆续成立。按计划，明年3月全国两会期间，将通过国家监察法并成立国家监察委员会。

用饮料服药 隐患多

送服药物要用白开水、纯净水或蒸馏水

□据新华社太原12月13日电

日常生活中，常有一些人为图方便、疏忽大意，用饮料送服药品。药监部门提示，用饮料送服药品不但影响药效，而且会增加药物毒副作用，切记送服药物要用白开水、纯净水或蒸馏水。

太原市药监局提示，咖啡、茶、牛奶、果汁甚至矿泉水等送服药物存在以下隐患：

咖啡中的咖啡因会刺激胃酸分泌，与布洛芬等解热镇痛类感冒药同服会加重对胃黏膜的刺激作用，易诱发胃出血、胃穿孔。

果汁多为酸性，可能导致一些抗生素及磺胺类抗菌药物提前分解；也可增强一些药物对胃肠道的刺激作用；会因酸碱中和而使一些碱性药物失效；可造成磺胺类药物溶解度降低，引起尿路结石。西柚汁会抑制肝脏中的代谢酶分泌使药物浓度升高，产生毒性反应，绝不能用其送服药物。

啤酒、可乐中含有食用乙醇，乙醇是药酶诱导剂，能增强肝药酶活性，降低安乃近等药物药效；可增加三环类抗抑郁药等药物的毒副作用；可使服用降糖药的糖尿病患者出现低血糖和不可逆的神经系统病变；还可增加中枢抑制药、成瘾性镇痛药、部分抗组织胺药的镇静作用，加深中枢抑制，甚至致人死亡。乙醇可使服用血管扩张药、降压药患者加重体位性低血压，可增强水杨酸类药物对患者消化道的刺激性。

茶含有较多的鞣质，与乳酶生、多酶片等酶制剂同服会降低药效。鞣质可使抗菌素和磺胺类药物失去抗菌活性，毒副作用增加；可与硫酸锌、葡萄糖酸锌、硫酸亚铁、富马酸铁、洋地黄甙类、维生素B₁、氨基匹林、麻黄碱、奎宁发生反应，造成疗效降低。

牛奶中的蛋白质和钙离子会与某些药物结合而影响药物的吸收，不建议与药物同服，除非一些明确说明可用牛奶送服的药物。

果汁、豆奶、汽水、啤酒中的蔗糖、蜂蜜能减慢胃内食物的排泄速度，延缓药物的吸收，减弱退热清、感冒清等药物的疗效；与降糖药、可的松类药物同服能升高血糖，出现糖尿；能酸化尿液，可使磺胺类药物溶解度降低而致尿中析出结晶或血尿；与利福平、阿斯匹林、消炎痛同服易加重肾毒性；可与氨茶碱、胃舒平、碳酸氢钠发生中和反应，使疗效降低或丧失；可使红霉素分解失效。

此外，矿泉水含有多种微量元素，某些金属元素可使四环素族、异烟肼抗菌作用减弱，强心甙类毒性增加，因此也不宜用于服药。